

Meteor

- › INSETTICIDA PIRETROIDE CHE AGISCE PER CONTATTO ED INGESTIONE
- › AMPIO SPETTRO D'AZIONE
- › ELEVATA EFFICACIA A BASSISSIMI DOSAGGI D'IMPIEGO DI PRINCIPIO ATTIVO
- › BREVE INTERVALLO DI SICUREZZA SU NUMEROSE COLTURE ORTO-FRUTTICOLE



COMPOSIZIONE
deltametrina* 1,51% (15,7 g/l)

CODICE IRAC
3A

FORMULAZIONE
sospensione concentrata (SC)

BUFFER ZONE
Consultare il riferimento
della sezione dedicata
(pag. 21)

INDICAZIONI DI PERICOLO
DPD: Pericoloso per l'ambiente (N)

CLP: H410; EUH208; EUH401



Attenzione

REG. MIN. SALUTE
n° 10976 del 12.07.2001

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	PHI	MAX
Agrumi	Afidi, Aleurodidi, Cocciniglie, Mosca degli agrumi	70-90 ml/hl	3 gg	3
Vite	Tignole, Nottue, Cicaline, Afidi, Sigaraio, Piralide	70-90 ml/hl		
Olivo	Cocciniglie, Tignola, Tripide, Mosca delle olive	80-90 ml/hl		
Ortaggi in pieno campo e serra (Cetriolo, Melanzana, Pomodoro, Zucchini, Zucca)	Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Cicaline, Criocera, Depressaria, Mosca, Piralide, Cavallette	80-90 ml/hl	7 gg Cipolla, Sedano, Porro, Patata, 3 gg altre colture	
Ortaggi in pieno campo (Aglio, Asparago, Carciofo, Cavoli, Carota, Cipolla, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Lattughe e simili, Melone, Pisello, Peperone, Porro, Rucola, Sedano, Spinacio)	Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi	60-70 ml/hl		
Patata				
Fragola (in pieno campo e serra)				
Frumento, Orzo, Mais	Piralide, Diabrotica, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi	0,6-0,8 l/ha	3 gg	

*s.a. originale Bayer CropScience



Meteor

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	PHI	MAX
Colza	Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, Meligete, Torticidi	0,6-0,8 l/ha	30 gg	3
Soia	Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, Meligete, Torticidi	0,6-0,8 l/ha	15 gg	
Cotone	Cicaline, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus	0,6 l/ha	3 gg	
Erba medica	Nottue, Misurino Cavallette	0,6 l/ha 0,8 l/ha		
Barbabietola da zucchero	Altica, Nottue, Mamestra Cleono, Lisso	0,6 l/ha 0,8 l/ha	n.r.	
Tabacco	Afidi, Tripidi, Nottue, Epitrix	0,6-0,8 l/ha		
Pioppo (in vivaio)	Tarło vespa, Gemmaiola Localizzati al tronco contro Criptorrinco e Megaplatypus mutatus	90 ml/hl 150 ml/hl		
Pioppo (in pieno campo)	Crisomelidi defogliatori Localizzati al tronco contro Criptorrinco e Megaplatypus mutatus	60-90 ml/hl 150-200 ml/hl	3 gg	
Floreali (in campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi, Cetonie, Maggiolino	80-90 ml/hl		
Vivai ed ornamentali (in campo e serra)	Afidi, Cimice del platano, Larve di lepidotteri, Maggiolino, Cetonie, Tingide	80-90 ml/hl		
Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Mandorlo	Psilla, Cocciniglia di San Josè (neanidi generazione estive), Cidia, Anarsia	90 ml/hl	3 gg	
	Microlepidotteri minatori del melo e del pero, Capua, Cacoecia, Antonomo, Maggiolino, Tentredini	60-90 ml/hl		
	Afide verde del melo, Afide del pesco, Tripidi, Mosca della frutta	70-90 ml/hl		
	Carpocapsa	60 ml/hl		
	Aromia bungii di Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino	60-90 ml/hl (trattamenti fogliari) 200 ml/hl (localizzati al tronco)		

FLACONE
0,25 litri (cartone 20 pz)

FLACONE
1 litro (cartone 10 pz)

TANICA
5 litri

AVVERTENZE

Bagnare uniformemente la vegetazione intervenendo su insetti esposti, non protetti da tessuti vegetali (es. foglie arrotondate). In caso di colture di difficile bagnatura aggiungere un idoneo coadiuvante (es. Vector a 50 ml/hl). Intervallo tra i trattamenti 7-14 gg

