

DELMUR TRAP

TRAPPOLA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO (RB)

per il controllo della mosca della frutta

Meccanismo d'azione IRAC 3A

DELMUR TRAP

Registrazione del Ministero della Salute n. 18695 del 13/03/25

Composizione:

Delta metrina pura g. 0,015 per trappola

Coformulanti qb a 100 g

EXCLUSIVAS SARABIA S.A.U.

Poligono Ind. Fondo de Litera, A2, Km 441,6

22520 Fraga (Huesca) Spagna

Tel. +34 973 737377

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P280 Indossare guanti protettivi. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimento di produzione:

EXCLUSIVAS SARABIA S.A.U. (Lleida) - Spagna

Distribuito da:

Rainbow Agrosiences Italy S.R.L., Cassano d'Adda (MI), Via Milano n. 12. Tel. +34 973737377

SIPCAM ITALIA S.p.A.; via Carroccio 8 – Milano Tel. +39 02/353781

Contenuto: confezioni contenenti 20, 400 trappole pronte all'uso



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. L'operatore deve usare guanti protettivi durante la manipolazione delle trappole.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti ana filassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

DELMUR TRAP è una trappola pronta all'uso che agisce con tecnologia "attract and kill", costituita da un dispositivo in plastica pronto all'uso.

Il dispositivo è composto da una base, sulla quale è collocato il dispenser impregnato di attrattivi, e da un coperchio trattato sulla superficie interna con l'insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Gli adulti della mosca vengono attirati dall'esca alimentare all'interno del dispositivo, entrano in contatto con l'insetticida e muoiono, cadendo sul fondo della trappola. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione dei frutteti sufficientemente duratura e con una grande sicurezza d'impiego.

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il dispositivo si usa per il controllo della mosca della frutta (*Ceratitis capitata*) su **AGRUMI (pompelmo, arancio, limone, lime, mandarino), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio), POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo del Giappone), KIWI, ALBERI DA FRUTTO TROPICALI (mango, papaia, frutto della passione)** impiegando 50-80 trappole/ha (a seconda della pressione del parassita).

Le trappole vanno posizionate quando le trappole di controllo (usate per il controllo del volo) catturano 1 adulto/trappola/giorno, oppure 30-40 giorni prima dell'inizio del cambiamento del colore dei frutti, oppure 50 giorni prima della raccolta.

Posizionare il dispositivo sulla parte terminale del ramo dell'albero, a 1,40-1,80 metri di altezza da terra, possibilmente nella zona della chioma esposta a sud, distribuendo le trappole nel frutteto in maniera uniforme ed omogenea (è consigliabile aumentare il numero di trappole ai margini del frutteto in situazioni specifiche, per esempio in presenza di vegetazione spontanea o campi adiacenti non trattati).

AVVERTENZE: Non usare se il contenitore in plastica risulta rotto o danneggiato o se il dispositivo proviene da confezioni non sigillate.

Conservare i dispositivi nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Non aprire il contenitore in plastica.

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**